

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3491 Streptopus amplexifolius</b>
Synonymes S. DISTORTUS Michx
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 30-60 cm, glabre, à souche courte garnie de nombreuses fibres réunies en boule</li> <li>- tige dressée flexueuse, anguleuse dans le haut, rameuse-dichotome, très feuillée</li> <li>- feuilles alternes, ovales-acuminées, embrassantes en cœur, minces, à nervures convergentes</li> <li>- fleurs blanchâtres, pendantes, axillaires, solitaires sur un pédoncule filiforme, articulé, coudé et comme brisé au-dessus du milieu</li> <li>- périanthe caduc, en cloche, à 6 divisions lancéolées, étalées-arquées au sommet</li> <li>- 6 étamines, insérées à la base des pétales</li> <li>- 1 style filiforme, stigmate obtus</li> <li>- baie subglobuleuse, rouge, à 3 loges à plusieurs graines arquées blanches.</li> </ul>
Écologie Bois et rochers humides des montagnes : Vosges, Jura, Alpes, Cévennes et Plateau central, Pyrénées ; Corse.
Répartition Europe centrale ; Asie et Amérique boréales.
Floraison Juin-juillet.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : racème simple Fruit : baie Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Sceau-de-Salomon noueux	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Streptope à feuilles embrassantes		Recommandé ou typique	
fra	Sceau-de-Salomon rameux	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Uvulaire	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Uvulaire à feuilles embrassantes	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Claspleaf Twistedstalk			
deu	Drehfuß			
cat	Estrèptopus			
ita	Lauro alessandrino			
deu	Stengelumfassender Knotenfuß			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte



## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **28 juin 1997**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Streptopus amplexifolius (L.) DC. [1805, in Lam. & DC. ; Fl. Franç., éd. 3, 3 : 174]**

Basionyme : *Uvularia amplexifolia* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 304]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Asparagaceae	100979
Genre	Streptopus	87271
Espèce	Streptopus amplexifolius	66482

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Streptopus amplexifolius* et code **2735** en tant que synonyme
  - le nom de *Streptopus distortus* et code **2735**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Streptopus amplexifolius* et code **3491**
  - le nom de *Streptopus distortus* et code **3491** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Streptopus amplexifolius* et code **2901**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Streptopus amplexifolius* et code **0850**
  - le nom de *Streptopus distortus* et code **0850** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Streptopus amplexifolius* et code **0158** en tant que nom retenu
  - le nom de *Streptopus distortus* et code **0158** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.