

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1738 Valerianella echinata DC.

- Plante annuelle de 10-30 cm, glabre, à tiges assez épaisses et lisses feuilles supérieures sinuées-dentées ou incisées

- fleurs blanchâtres ou lilacées, en têtes planes et serrées, portées sur des pédoncules à la fin très épaissis
 calice à limbe formé de 3 cornes coniques, arquées en dehors, la plus longue correspondant à la loge fertile du fruit
- fruits persistants, glabres, spongieux, ceux des dichotomies linéaires et droits, les autres oblongs, à 3 angles obtus, 3 côtes et 3 sillons irréguliers.

Écologie Moissons du Midi, jusque dans les Hautes-Alpes, la Drôme, l'Aveyron ; Corse.

Répartition Europe méditerranéenne ; Asie Mineure ; Syrie ; Afrique septentrionale

Floraison Avril-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux Formation végétale : thérophytaie Chorologie : méditerranéen Inflorescence : cyme multipare Fruit : akène sexualité : hermaphrodite Pollinisation : autogame Couleur de la fleur : blanc, rose Floraison : de avril à juin Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

lumière ombre Lumière humide Humidité Atmosphérique chaud froid Temperature continental Continentalité

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol





Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Mâche à piquants	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Valérianelle à piquants	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Gallinella riccia			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Cité par erreur comme présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
	1	

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à inconnu observée le 21 mai 2012 par Marie Portas

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations

Maille: comportant plusieurs sources de données distinctes BazNat - Flore: données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.

Flora data: données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR: données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).

IFN: données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National Vigie Flore: données issues de programme Vigie-Flore PhotoFlora: données issues de

Vigie Flore : données issues du programme Vigie-Flore

PhotoFlora : données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit
BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Valerianella echinata (L.) DC. [1805, in Lam. & DC. ; Fl. Franç., éd. 3, 4:242l

Basionyme: Valeriana echinata L. [1759, Syst. Nat., éd. 10, 2:861]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Léaende Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du tax on dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Dipsacales	102766
Famille	Caprifoliaceae	101054
Genre	Valerianella	87377
Espèce	Valerianella echinata	70664

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
- le nom de Valerianella echinata et code 0986
 Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
 le nom de Valerianella echinata et code 1738
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
- le nom de Valerianella echinata et code 3642
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
 - le nom de Valerianella echinata et code **0625** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France. Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.). Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres

Numéro du type: 70552