

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4051 <i>Ventenata avenacea</i>
Synonymes V. DUBIA Boiss. ; AVENA DUBIA Leers, A. TENUIS Moench
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 20-60 cm, glabre, à racine fibreuse - tiges dressées, grêles - feuilles courtes, étroites (1 mm) bientôt enroulées, à ligule lancéolée - panicule pyramidale, très lâche, étalée, verte, à rameaux rudes, longuement nus, portant au sommet 2-5 épillets dressés, rapprochés - épillets d'environ 8 mm oblongs-étroits, à 2-3 fleurs fertiles, l'inférieure subsessile, les autres pédicellés - glumes inégales, plus courtes que les fleurs, acuminées-mucronées, à 7-9 nervures scabres - glumelles inégales, l'inférieure herbacée, entière en alène et sans arête dorsale dans la fleur inférieure, terminée dans les autres par 2 soies et munie sur le dos d'une longue arête genouillée - caryopse glabre, canaliculé à la face interne.
Écologie Lieux secs et arides du Midi et du Centre, jusqu'à la côte-d'Or, le Loiret, Loir-et-Cher.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.
Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Venténate douteuse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ventenatée douteuse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fausse Avoine	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
eng	North Africa Grass			
deu	Schmielenhafer			
ndl	Smelehaver			
cat	Ventenata			
ita	Ventenata			
eng	Ventenatagrass			
deu	Zarter Grannenhafer			
deu	Zweifelhafter Grannenhafer			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]ROYER Charles - **Extrait d'une lettre à M. Malinvaud.** - 1883, p. 277- 278 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 30 - Fascicule 1

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Ventenata dubia (Leers) Coss. [1855, in Coss. & Durieu, Explor. Sci. Algérie, 2 : 104]

Basionyme : *Avena dubia* Leers [1775, Fl. Herborn., 41 tab. 9, fig. 3]

Dernière date de modification du nom : 6/11/2023 12:28:43

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Ventenata	87381
Espèce	Ventenata dubia	70721

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Avena dubia* et code **4051** en tant que syn2
 - le nom de *Avena tenuis* et code **4051** en tant que syn3
 - le nom de *Ventenata avenacea* et code **4051**
 - le nom de *Ventenata dubia* et code **4051** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Avena dubia* et code **0250** en tant que synonyme
 - le nom de *Ventenata avenacea* et code **250**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Ventenata avenacea* et code **0288** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Ventenata dubia* et code **0288** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ventenata avenacea* et code **2229** en tant que synonyme
 - le nom de *Ventenata dubia* et code **2229**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Ventenata bromoides* et page **0894** en tant que synonyme
 - le nom de *Ventenata dubia* et page **0894** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.