

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| <b>4051 <i>Ventenata avenacea</i></b>   |
| Synonymes <i>V. DUBIA</i> Boiss. ; <i>AVENA DUBIA</i> Leers, <i>A. TENUIS</i> Moench  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle de 20-60 cm, glabre, à racine fibreuse</li> <li>- tiges dressées, grêles</li> <li>- feuilles courtes, étroites (1 mm) bientôt enroulées, à ligule lancéolée</li> <li>- panicule pyramidale, très lâche, étalée, verte, à rameaux rudes, longuement nus, portant au sommet 2-5 épillets dressés, rapprochés</li> <li>- épillets d'environ 8 mm oblongs-étroits, à 2-3 fleurs fertiles, l'inférieure subsessile, les autres pédicellés</li> <li>- glumes inégales, plus courtes que les fleurs, acuminées-mucronées, à 7-9 nervures scabres</li> <li>- glumelles inégales, l'inférieure herbacée, entière en alène et sans arête dorsale dans la fleur inférieure, terminée dans les autres par 2 soies et munie sur le dos d'une longue arête genouillée</li> <li>- caryopse glabre, canaliculé à la face interne.</li> </ul> |
| Écologie Lieux secs et arides du Midi et du Centre, jusqu'à la côte-d'Or, le Loiret, Loir-et-Cher.  |
| Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.   |
| Floraison Mai-juillet.  |

## Ecologie

Aucune donnée.

## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                       | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------|
| fra    | Venténate douteuse        | Féminin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Ventenatée douteuse       | Féminin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Fausse Avoine             | Féminin singulier | Secondaire ou régional |       |
| eng    | North Africa Grass        |                   |                        |       |
| deu    | Schmielahafer             |                   |                        |       |
| ndl    | Smelehaber                |                   |                        |       |
| cat    | Ventenata                 |                   |                        |       |
| ita    | Ventenata                 |                   |                        |       |
| eng    | Ventenatagrass            |                   |                        |       |
| deu    | Zarter Grannahafer        |                   |                        |       |
| deu    | Zweifelhafter Grannahafer |                   |                        |       |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

**Ventenata dubia (Leers) Coss. [1855, in Coss. & Durieu ; Explor. Sci. Algérie, 2 : 104]**

Basionyme : *Avena dubia* Leers [1775, Fl. Herborn., 41 tab. 9, fig. 3]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique  | Num Nom |
|---------|-------------------|---------|
| Cladus  | Plantae           | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes      | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes     | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes     | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes    | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes    | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes      | 101135  |
| Cladus  | Monocotyledones   | 101139  |
| Cladus  | Commelinidees     | 100969  |
| Ordre   | Poales            | 100977  |
| Famille | Poaceae           | 100898  |
| Genre   | Ventenata         | 87381   |
| Espèce  | Ventenata dubia   | 70721   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Avena dubia* et code **4051** en tant que syn2
  - le nom de *Avena tenuis* et code **4051** en tant que syn3
  - le nom de *Ventenata avenacea* et code **4051**
  - le nom de *Ventenata dubia* et code **4051** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Avena dubia* et code **0250** en tant que synonyme
  - le nom de *Ventenata avenacea* et code **0250**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Ventenata avenacea* et code **0288** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Ventenata dubia* et code **0288** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Ventenata avenacea* et code **2229** en tant que synonyme
  - le nom de *Ventenata dubia* et code **2229**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Ventenata bromoides* et page **0894** en tant que synonyme
  - le nom de *Ventenata dubia* et page **0894** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 8625