

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|  |
|--|
| <b>1982 Bupthalmum salicinum L.</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace à tige de 3-7 dm, simple ou rameuse, pubescente</li> <li>- feuilles pubescentes, faiblement dentées, oblongues-lancéolées, les caulinaires sessiles, aiguës, les inférieures rétrécies en pétiole, obtuses au sommet</li> <li>- involucre à folioles lancéolées, acuminées</li> <li>- réceptacle à écailles linéaires, carénées, mucronées, les extérieures atténuées au sommet, les intérieures tronquées sous le mucron</li> <li>- akènes des ligules obovales, longs de 3 mm 12 environ, lisses à 3 côtes très saillantes, presque ailées, ceux du centre oblongs comprimés un peu anguleux, surmontés d'une couronne laciniée</li> <li>- capitules grands, 5 cm de diamètre environ, solitaires, terminaux</li> <li>- fleurs jaunes.</li> </ul> |
| Écologie Prairies, bords et clairières des bois dans l'Est et le Sud-Est : Alsace, Jura, Bugey, côte-d'Or, Savoie, Isère, Drôme.   |
| Répartition Europe centrale.   |
| Floraison Juillet-août.  |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|   |   |
|---|---|
| Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome  |   |
| Formation végétale : hémicryptophytaie  |   |
| Chorologie : européen central   |   |
| Inflorescence : corymbe de capitules<br>Fruit : akène<br>Couleur de la fleur : jaune<br>Floraison : de juillet à août | sexualité : gynomonioïque<br>Pollinisation : entomogame, autogame<br>Dissémination : anémochore |

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                            | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Buphtalme                      | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Buphtalme à feuilles de saule  | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Oeil-de-boeuf                  | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Buphtalme à feuilles de saule  | Masculin singulier | Peu usité et à éviter |       |
| fra    | Buphtalmum à feuilles de saule | Masculin singulier | Peu usité et à éviter |       |
| ita    | Asteroida salicina             |                    |                       |       |
| deu    | Gemeines Ochsenauge            |                    |                       |       |
| ndl    | Koeieoog                       |                    |                       |       |
| eng    | Ox-eye                         |                    |                       |       |
| deu    | Weidenblättriges Ochsenauge    |                    |                       |       |
| deu    | Weidenblättriges Rindsauge     |                    |                       |       |

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | 0                   | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |
|                   |                 | 0     |

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **6 juin 1993**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

***Bupthalmum salicifolium* L. [1753· Sp. Pl., 2 : 904]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
-

## Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                             | Num Nom      |
|-------------|--|--------------|
| Cladus      | Plantae                                      | 101140       |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                            | 102735       |
| Cladus      | Embryophytes                                 | 102762       |
| Cladus      | Stomatophytes                                | 102768       |
| Cladus      | Hemitracheophytes                            | 101137       |
| Cladus      | Tracheophytes                                | 87491        |
| Cladus      | Euphyllophytes                               | 87521        |
| Cladus      | Spermatophytes                               | 102795       |
| Cladus      | Angiospermes                                 | 101135       |
| Cladus      | Eudicotyledones                              | 101004       |
| Cladus      | Dicotyledones Vraies Superieures             | 101029       |
| Cladus      | Asteridees                                   | 102752       |
| Cladus      | Campanulidees                                | 102761       |
| Ordre       | Asterales                                    | 102760       |
| Famille     | Asteraceae                                   | 100897       |
| Genre       | Buphthalmum                                  | 86045        |
| Espèce      | <b>Buphthalmum salicifolium</b>              | <b>75002</b> |
| Sous-Espèce | Buphthalmum salicifolium subsp. salicifolium | 11495        |
| Sous-Espèce | Buphthalmum salicifolium subsp. flexile      | 77087        |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Buphthalmum grandiflorum* et code **1983**
  - le nom de *Buphthalmum salicifolium* et code **1982**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Buphthalmum grandiflorum* et code **0524** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Buphthalmum salicifolium* et code **0524** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Buphthalmum salicifolium subsp. grandiflorum* et code **3839** en tant que -2°
  - le nom de *Buphthalmum salicifolium* et code **3839**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Buphthalmum salicifolium* et code **2085**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Buphthalmum salicifolium* et page **0707** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.