

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3323 *Ephedra distachya* Raisin de mer

Synonymes *E. VULGARIS* Rich.

- Sous-arbrisseau de 40 cm à 1 mètre, souvent couché ou ascendant, à rameaux un peu épais, opposés, verticillés ou fasciculés, d'un vert glauque
- articles longs de 2-4 cm, à gaines de 2-3 mm, étroites, non évasées
- chatons ordinairement agglomérés, les mâles ovoïdes, pédoncules ou subsessiles, composés de 4-8 paires de fleurs à environ 8 anthères
- les femelles biflores, pédoncules, à 3-4 paires d'écailles
- style long, droit, saillant
- fruit mûr rouge, subglobuleux, à 2 graines. Varie, dans les basses montagnes à rameaux vert clair, chatons subsessiles, style flexueux (*E. helvetica* C. A. Mey.).

Écologie Sables du littoral de la Méditerranée et de l'Océan jusqu'en Bretagne ; Corse.

Répartition Europe méridionale ; région méditerranéenne ; Sibérie. - Fl. mai-juin, fr. août-sept.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents

Formation végétale : chaméphytaie

Chorologie : eurasiatique méridional

Inflorescence : glomérules

Fruit : baie

Couleur de la fleur : jaune, vert

sexualité : dioïque

Pollinisation : anémogame


Dissémination : endozoochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Éphédra à chatons opposés	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Uvette	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Éphédre à chatons opposés	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Éphédre commun	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Raisin-de-mer	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Belcho			
ita	Efedra distachia			
eng	Jointfir			
deu	Meertraubel			
cat	Trompera			
spa	Uva de mar			
spa	Uva marina			
deu	Zweijähriges Meerträubchen			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Ephedra distachya* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1040]**

Basionyme : *Ephedra distachya* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1040]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:24

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Gymnospermes	101132
Cladus	Gnetophytes	102773
Ordre	Ephedrales	102777
Famille	Ephedraceae	100943
Genre	Ephedra	85564
Espèce	<i>Ephedra distachya</i>	75107
Sous-Espèce	<i>Ephedra distachya</i> subsp. <i>distachya</i>	23987
Sous-Espèce	<i>Ephedra distachya</i> subsp. <i>helvetica</i>	119721

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ephedra vulgaris* et code **3323** en tant que synonyme
 - le nom de *Ephedra distachya* et code **3323**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Ephedra distachya* et code **0035** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*