

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|  |   |
|--|---|
| Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à rhizome  |   |
| Formation végétale : hémicryptophytaie   |   |
| Chorologie : méditerranéen(eury)   |   |
| Inflorescence : panicule d'épillets<br>Fruit : caryopse<br>Couleur de la fleur : rose<br>Floraison : de août à octobre | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : anémogame<br>Dissémination : barochore |

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                 | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Molinie tardive     | Féminin singulier  | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Cleistogène tardif  | Masculin singulier | Peu usité et à éviter |       |
| fra    | Cléistogénès tardif | Masculin singulier | Peu usité et à éviter |       |
| fra    | Diplachné tardive   |                    | Peu usité et à éviter |       |
| cat    | Diplacne            |                    |                       |       |
| ita    | Paléo tardivo       |                    |                       |       |
| deu    | Steifhalm           |                    |                       |       |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Ēla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

**Alimentaire**

**Médicinal**

**Autre**


## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts



## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Kengia serotina* (L.) Packer [1960, Bot. Not., 113 : 291]**

Basionyme : *Festuca serotina* L. [1759, Syst. Nat., éd. 10, 2 : 876]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:30

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|-------------|----------------------------------|---------|
| Cladus      | Plantae                          | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus      | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus      | Monocotyledones                  | 101139  |
| Cladus      | Commelinidees                    | 100969  |
| Ordre       | Poales                           | 100977  |
| Famille     | Poaceae                          | 100898  |
| Genre       | Kengia                           | 86634   |
| Espèce      | Kengia serotina                  | 75198   |
| Sous-Espèce | Kengia serotina subsp. serotina  | 36869   |
| Sous-Espèce | Kengia serotina subsp. bulgarica | 119010  |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Cleistogenes serotina* et code **2694**
  - le nom de *Diplachne serotina* et code **2694** en tant que syn1
  - le nom de *Molinia serotina* et code **2694** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
  - le nom de *Molinia serotina* et code **0255** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Diplachne serotina* et code **2355**
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France* (3 vol.). sous :
  - le nom de *Diplachne serotina* et code **4127** en tant que syn1
  - le nom de *Festuca serotina* et code **4127** en tant que syn2
  - le nom de *Molinia serotina* et code **4127**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Diplachne serotina* et code **328**
  - le nom de *Molinia serotina* et code **0328** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 27645