

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2082 <i>Centaurea cineraria</i>
Synonymes C. CINEREA auct. quorumd. non Lamk.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace à souche ligneuse - tige de 2-8 dm, dressée, robuste, blanche-tomenteuse, rameuse, à rameaux étalés - feuilles blanches-tomenteuses, les inférieures bi-tripennatiséquées, les caulinaires pennatiséquées ou pennatipartites à segments linéaires-lancéolés, entiers - capitules médiocres accompagnés de feuilles florales courtes, oblongues, arrondies ou subspatulées - involucre ovoïde à folioles appliquées un peu pubescentes jaunâtres à appendice un peu décurrent, brun, cilié - akènes gris, longs de 5 mm environ, à cils très courts (14 ou 15 de l'akène), à ombilic allongé en pointe - fleurs purpurines, les extérieures rayonnantes.
Écologie Rochers du littoral des Alpes-Maritimes à Eze et Villefranche.
Répartition Italie, Dalmatie.
Floraison Mai-juin.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen (ligure)	
Inflorescence : cyme de capitules Fruit : akène	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Centaurée cinéraire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Dusty-miller			
ita	Fiordaliso delle scogliere			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présence accidentelle	Présence accidentelle	Absent
Statut d'introduction	Introduit		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **22 juin 2015**
par **Mathias C**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Centaurea cineraria L. [1753, Sp. Pl., 2 : 912]

Basionyme : *Centaurea cineraria* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 912]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Centaurea	83417
Espèce	<i>Centaurea cineraria</i>	75460
Sous-Espèce	<i>Centaurea cineraria</i> subsp. <i>cineraria</i>	15107
Variété	<i>Centaurea cineraria</i> var. <i>pandataria</i>	84566
Sous-Espèce	<i>Centaurea cineraria</i> subsp. <i>umbrosa</i>	102886

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Centaurea cineraria* et code **2082**
 - le nom de *Centaurea cinerea* et code **2082** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Centaurea cineraria* et code **0410** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 75460