

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 125 <i>Papaver somniferum</i> L. Pavot |
| <ul style="list-style-type: none"> - . Plante annuelle, très glauque - tige de 40 cm à 1 mètre, robuste, creuse, peu rameuse - feuilles grandes, incisées-dentées, les caulinaires embrassantes - fleurs rougeâtres, rosées ou blanches, très grandes - filets des étamines blancs, en massue - stigmates 8-15, sur un disque à lobes profonds, écartés - capsule grosse, subglobuleuse, glabre. Varie à feuilles et pédoncules hérissés de longues soies (<i>P. setigerum</i> DC.) - à feuilles glabres, avec capsule de la grosseur d'une noisette, à pores déhiscents (<i>P. hortense</i> Huss.), ou du volume d'une grosse noix, à pores indéhiscentes (<i>P. officinale</i> Gmel.). |
| Écologie Lieux incultes, dans la région méditerranéenne jusque dans l'Aveyron. |
| Répartition Europe méridionale ; Afrique septentrionale. |
| Floraison Mai-juillet. . |
| Usages Cultivé pour ses fleurs, ses capsules et ses graines. |

Description Baseflor


Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

| | |
|--|---|
| Type Biologique : Thérophytes (>=1m) estivaux | |
| Formation végétale : thérophytaie | |
| Chorologie : méditerranéen | |
| Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc, rose Floraison : de mai à juillet | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore |


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|--------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Pavot à opium | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Pavot officinal | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Opium | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Pavot somnifère | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Papari | | Peu usité et à éviter | |
| spa | Adormidera | | | |
| spa | Amapola real | | | |
| cat | Cascall | | | |
| eng | Garden-poppy | | | |
| cat | Herba dormidora | | | |
| ndl | Maankop | | | |
| ndl | Maanzaad | | | |
| eng | Oilseed Poppy | | | |
| eng | Opium Poppy | | | |
| ita | Papavero da oppio | | | |
| ita | Papavero domestico | | | |
| deu | Schlaf-Mohn | | | |
| deu | Schlafmohn | | | |
| eng | White Poppy | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|------------------|-----------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'origine | Non natif | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |

Illustrations


Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
 observée le **27 juin 2012**
 par **Pierre Le Gall**

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Papaver somniferum subsp. somniferum

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|--------------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Ordre | Ranunculales | 101013 |
| Famille | Papaveraceae | 100912 |
| Genre | Papaver | 85382 |
| Espèce | Papaver somniferum | 47858 |
| Sous-Espèce | Papaver somniferum subsp. somniferum | 83030 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Papaver somniferum subsp. somniferum* et code **0877** en tant que nom retenu