Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

117 Berberis vulgaris L. *Epine-vinette*
- . Arbrisseau de 1 à 3 mètres, à rameaux dressés, cannelés, grisâtres, glabres - feuilles obovales-oblongues, atténuées en pétiole, denlelées et munies au sommet et au bord de cils raides - épines presque de moitié plus courtes que les feuilles - fleurs en grappes plus longues que les feuilles - baies d'un rouge vif à la maturité, à suc acide.
Écologie Haies, bois et côteaux, dans presque toute la France.
Répartition Presque toute l'Europe ; Asie occidentale ; Inde.
Floraison mai-juin ; Fructification septembre-octobre
Usages Les baies sont rafraîchissantes et servent à préparer des gelées, des conserves et des sirops ; le bois fournit une couleur jaune.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : européen tempéré	
Inflorescence : racème simple Fruit : baie Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !

Identification


Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Épine-vinette	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vinettier	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Agrivoutat	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Agrivoutier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Berbéris commun	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Pisse-vinaigre	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
cat	Acetín			
spa	Agracejo			
spa	Agrito			
spa	Arlo			
eng	Barberry			
deu	Beerdorn			
spa	Berberís			
ita	Berbero			
eng	Berbery			
spa	Bérbezo			
deu	Bubenstrauch			
eng	Common Barberry			
cat	Coralet			
ita	Crespino comune			
deu	Gewöhnliche Berberitze			
eng	Pepperidge Bush			
cat	Sapalarra			
deu	Sauerdorn			
ita	Spino vineto			
spa	Vinagrera			
ndl	Zuurbes			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juillet 1994**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BATTANDIER J.A. - **Révision des Paronyques algériennes à grandes bractées argentées.** - 1899, p. 251- 252 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 46 - Fascicule 4
- [Botanique]DUMEE Paul ; MALINVAUD Ernest - **Un Vicia nouveau pour la flore française.** - 1899, p. 251- 251 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 46 - Fascicule 4
- [Botanique]LOTHELIER A. - **Influence de l'état hygrométrique de l'air sur la production des piquants.** - 1890, p. 176- 179 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 37 - Fascicule 1

Répartition

Chorologie départementale



- **non renseignée**
- **présence**
- **présence à confimer**
- **douteux**
- **disparu**
- **erreur**
- **erreur à confirmer**

Observations

- **Maille :** comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore :** données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.
- **Flora data :** données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR :** données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques :** données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN :** données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore :** données issues du programme Vigie-Flore
- **PhotoFlora :** données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Légende

Nom sélectionné

Berberis vulgaris L. [1753, Sp. Pl., 1 : 330]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Berberidaceae	100987
Genre	Berberis	85988
Espèce	Berberis vulgaris	9456
Sous-Espèce	Berberis vulgaris subsp. australis	9458
Sous-Espèce	Berberis vulgaris subsp. seroi	9461
Sous-Espèce	Berberis vulgaris subsp. vulgaris	83149

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Berberis vulgaris* et code **1831**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Berberis vulgaris* et code **0117**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Berberis vulgaris* et code **0213**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Berberis vulgaris* et code **1648**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Berberis vulgaris* et page **0089** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Berberis vulgaris* et code **0539** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *Flora Europaea*