

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1989 <i>Bidens tripartitus</i> L. Chanvre d'eau
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle à tige de 2-5 dm dressée, à rameaux étalés, presque glabre - feuilles glabres, opposées, pétiolées à pétiole ailé, fortement dentées, les supérieures tripartites à segments lancéolés, le terminal plus grand, feuilles inférieures indivises - involucre à folioles extérieures foliacées, les intérieures plus courtes ovales-lancéolées, scarieuses, striées de brun - écailles du réceptacle linéaires-oblongues - akènes longs de 5 à 6 mm oblongs, cunéiformes, surmontés de 2 ou 3 arêtes subulées, épineuses - capitules dressés solitaires à fleurs jaunes, toutes tubuleuses.
Écologie Lieux humides, dans toute la France, plus rare dans la région méditerranéenne.
Répartition Europe, Orient, Sibérie, Japon, Amérique septentrionale.
Floraison Août-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Thérophytes (>=1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : eurasiatique méridional	
Inflorescence : cyme de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de août à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : épizoochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Bident à feuilles tripartites	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bident à trois folioles	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bident trifoliolé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bident triparti	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bident tripartite	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chanvre d'eau	Masculin singulier	Secondaire ou régional	Nom donné également à <i>Eupatorium cannabinum</i> L. et <i>Lycopus europaeus</i> L..
fra	Cornuet		Secondaire ou régional	
fra	Eupatoire aquatique	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Bastard Agrimony			
eng	Bastard Hemp			
cat	Bident tripartit			
eng	Burr Marigold			
deu	Dreiteiliger Zweizahn			
ndl	Driedelig Tãndzaad			
ita	Forbicina comune			
ndl	Gevleugeld Tãndzaad			
deu	Sumpfzweizahn			
eng	Threelobe Beggarticks			
eng	Trifid Bur-marigold			
ndl	Veerdelig Tãndzaad			
eng	Water Agrimony			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 août 1874**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Bidens tripartita L. [1753, Sp. Pl., 2 : 831]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Bidens	85996
Espèce	Bidens tripartita	9719
Sous-Espèce	Bidens tripartita subsp. bullata	9720
Sous-Espèce	Bidens tripartita subsp. tripartita	9722
Sous-Espèce	Bidens tripartita subsp. comosa	118590

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Bidens tripartita* et code **3853**
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Bidens hirta* et code **1988** en tant que synonyme
 - le nom de *Bidens tripartita* et code **1989**
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica*. sous :
 - le nom de *Bidens hirta* et code **0519** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Bidens tripartita* et code **0519** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Bidens tripartita* et code **2097**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Bidens tripartita f. minor* et page **0714** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.