

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 1484 *Bifora testiculata* DC.

- Plante annuelle de 20-30 cm, glabre, fétide, à tige striée, rameuse
- feuilles radicales pennatiséquées, à segments tripartites, à lobes en coin, incisés-dentés, les caulinares bipennatiséquées, à lobes divariqués, linéaires-aigus
- fleurs blanches, presque égales, en ombelles à 2-3 rayons striés
- ombellules à 23 fleurs toutes fertiles
- involucre et involucrelle à 1 foliole linéaire
- styles courbés en dehors, égalant le stylopode
- fruit didyme, très rugueux, échancré à la base, terminé au sommet par un mamelon conique.

Écologie Champs du Midi et de l'Ouest ; remonte jusque dans le Maine-et-Loire et le Cher ; Corse.

Répartition Europe méridionale ; Chypre, Syrie ; Afrique septentrionale.

Floraison Avril-juin.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : méditerranéen

Inflorescence : ombelle d'ombellules  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : blanc  
Floraison : de avril à juin


sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : barochore

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques




#### caractéristiques du sol





## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **1 juin 1853**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Bifora testiculata* (L.) Spreng. [1820, in Roem. & Schult. ; Syst. Veg., éd. 15, 6 : 448]**

Basionyme : *Coriandrum testiculatum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 256]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	<i>Bifora</i>	85997
Espèce	<i>Bifora testiculata</i>	9732

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Bifora dicoeca* et page **0499** en tant que synonyme
  - le nom de *Bifora testiculata* et page **0499** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Bifora testiculata* et code **0757**
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Bifora testiculata* et code **1484**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Bifora testiculata* et code **2792**
  - le nom de *Coriandrum testiculatum* et code **2792** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
  - le nom de *Bifora testiculata* et code **0336** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France.*

## Autres

- Numéro du type : 18929