

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2493 <i>Chlora serotina</i> Koch.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 10-40 cm, d'un glauque blanchâtre, à tige raide, simple ou rameuse au sommet - feuilles radicales obovales, en rosette, les caulinaires ovales ou ovales-lancéolées, arrondies à la base et à soudure moindre que leur largeur - fleurs d'un jaune pâle, en cyme dichotome pluriflore - pédoncules fructifères longs de 2-4 cm - calice divisé presque jusqu'à la base en lobes linéaires-lancéolés, obscurément trinervés, dressés - corolle large de 12-14 mm, dépassant un peu le calice, à environ 8 lobes subaigus - capsule ovoïde, plus courte que les lobes lâchement dressés du calice.
Écologie Lieux sablonneux humides du Midi : Basses-Pyrénées, Charente-Inférieure, Hérault, Gard, Ardèche, Var, Drôme, Isère, Haute-Savoie ; Alsace ; Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie Mineure.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)-atlantique(eury)	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Blackstonie acuminée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chlore acuminée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chlore tardive	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Centauro acuminato			
deu	Herbstbitterling			
ndl	Herfstbitterling			
deu	Spätblühender Bitterling			
deu	Später Bitterling			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]FOL A. - **Blackstonia acuminata (Koch et Ziz) Domin Blackstonia perfoliata subsp. serotina (Reichenb.) Vollmann (chlore tardive), à Grenoble** - 1998, p. 30- 30 - Départ./Région : 38, Le Monde des plantes, 7, N°462

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Blackstonia acuminata subsp. acuminata

Basionyme : *Chlora acuminata* W.D.J.Koch & Ziz [1814, Catal. Fl. Palat., 20]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Gentianales	102764
Famille	Gentianaceae	101102
Genre	Blackstonia	86000
Espèce	Blackstonia acuminata	74996
Sous-Espèce	Blackstonia acuminata subsp. acuminata	9873

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Blackstonia acuminata subsp. acuminata* et code **1078**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Blackstonia acuminata subsp. acuminata* et code **0771** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 16979