

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2548 Borrago laxiflora DC.

- Plante vivace de 20-60 cm, hispide, à tiges faibles, décombantes, rameuses
- feuilles ondulées, peu épaisses, les radicales obovales ou oblongues, insensiblement atténuées en long pétiole, les caulinaires écartées, sessiles-embrassantes
- fleurs d'un pourpre violet, petites, longuement pédonculées, en grappes allongées, très lâches, munies de bractées
- pédoncules filiformes, flexueux et réfléchis après la floraison, à poils appliqués
- calice petit, à lobes lancéolés en alêne, 2 fois plus courts que la corolle, non connivents, aigus à la maturité
- corolle en coupe, à tube large et court, à lobes ovales, obtus
- carpelles bruns, petites, obovales.

Écologie Lieux humides de la région moyenne et un peu basse de la Corse.

Répartition Sardaigne, Caprara. Espèce spéciale à ces îles.

Floraison Mars-novembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : corso-sarde

Inflorescence : racème de cymes unipares scorpioides
Fruit : akène
Couleur de la fleur : rose
Floraison : de mars à novembre


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : épizoochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Bourrache à fleurs espacées	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bourrache naine	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Borragine nana di Capraia			
ita	Borragine di Sardegna			
eng	Slender Borage			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Absent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
 observée le **29 décembre 2007**
 par **Christophe Girod**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Borago pygmaea (DC.) Chater & Greuter [1972. Bot. J. Linn. Soc., 65 : 261]

Basionyme : *Campanula pygmaea* DC. [1805, in Lam. & DC. ; Fl. Franç., éd. 3, 3 : 705]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Boraginales	124889
Famille	Boraginaceae	100904
Genre	Borago	86014
Espèce	Borago pygmaea	9968

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Borago laxiflora* et code **1226** en tant que synonyme
 - le nom de *Borago pygmaea* et code **1226**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Borago laxiflora* et code **2548**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Borago laxiflora* et code **3129**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Borago laxiflora* et code **0545** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Borago pygmaea* et code **0545** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 12565